

VIUSID[®] vet

excelente respuesta frente a la Influenza Aviar

PARA EVITAR RIESGOS
PREVENCIÓN



catalysis

DIVISIÓN AGROVETERINARIA



Cuando la Influenza Aviar (IA) estalla en la granja...
¿Qué debemos hacer?

Lo que necesitamos hacer ahora es:
Añadir 2 litros de VIUSID® Vet en cada 1.000 litros de agua de bebida, durante 3 días en aplicaciones cada 8 horas, limitando el suministro de agua para inducir la sed en las aves.

APLICACIÓN DE VIUSID® Vet EN UNA GRANJA AVICOLA DE TAIWAN

GRANJA CON 35.000 POLLOS DE RAZA ROSS en TAIWAN a principios de marzo de 2017.

DIAGNÓSTICO: H5N6, serotipo de alta patogenicidad.

MORTALIDAD: 1.400 aves muertas al segundo día de infección.

PERIODO DE TRATAMIENTO: 3 días.

ADMINISTRACIÓN:

Se añaden 2 litros de **VIUSID® Vet** en 1.000 litros del agua de bebida por día, desde el inicio del brote hasta el tercer día del mismo.

Para forzar a las aves a beber el agua tratada, se cierra el suministro de agua durante 1 - 2 horas y se abre 3 - 4 horas 3 veces al día para garantizar que las aves toman el tratamiento un mínimo de 8 horas al día.


RESULTADOS:



Pollo infectado por la Gripe Aviar antes del tratamiento



Pollo infectado por la Gripe Aviar tratado con **VIUSID® vet** durante 3 días



Como se puede observar en el diagrama, después de administrar **VIUSID® Vet**, la mortalidad por infección viral desciende de manera radical tras el primer día de tratamiento, y la ingesta de comida y agua se normalizan a partir del tercer día. Por otro lado, las fotos muestran claramente la mejoría de las aves a los 3 días de tratamiento.

CONCLUSIÓN:

El efecto de VIUSID® Vet contra el brote de IA es extremadamente rápido y seguro, reduciendo drásticamente las pérdidas económicas causadas por esta enfermedad.